

le sanglier

Le sanglier (*Sus scrofa*) est un mammifère omnivore proche du porc, dont il est l'ancêtre, appartenant à la famille des Suidés. Celle-ci appartient au taxon des Artiodactyles suiformes. Sa femelle se nomme la laie, les petits sont des marcassins, les jeunes des "bêtes rousses", les mâles âgés des "solitaires". Caractéristiques

Statut : commun

Vie sociale : en groupe les deux premières années Longueur : de 90 à 180 cm Queue : 30 cm

Hauteur au garrot : 55 à 110 cm

Poids : 50 à 350 kg

Maturité sexuelle : 8 à 10 mois

Période de reproduction : pas de période précise

Durée de gestation : de 100 à 140 jours

Portée : 1 à 12, (généralement 1 à 4)

Régime alimentaire : glands, fânes, châtaignes, pousses, racines, vers, larves, champignons, petits rongeurs, charognes (à l'occasion)

Longévité : 27 ans

Reproduction:

Le rut s'étale d'octobre à février. Lors d'affrontements violents entre mâles, des blessures parfois importantes peuvent être occasionnées. La gestation dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours (soit 114 à 116 jours), la laie met bas dans le chaudron, (une excavation plus ou moins aménagée dans la végétation basse) de 2 à 12 marcassins aux yeux ouverts. Le nombre de petits est corrélé au poids initial de la femelle (40kg : deux petits, 60kg : quatre petits), mais dans le sud de la France les populations de sangliers ont été recrées ou renforcées par des hybrides de cochon domestique dans le but d'augmenter la prolificité. L'allaitement dure 2 à 3 mois, mais les jeunes sont aptes à suivre la mère dans ses déplacements dès la fin de leur première semaine. Bien que capables de subvenir à leurs propres besoins vers l'âge de 6 mois, ils demeureront dans le groupe familial encore une ou deux années.